

Allergènes :

J'ÉVALUE ⇨ JE TRAITE ⇨ J'APPELLE LE SAMU 15

Nom et prénom de l'élève :	Classe :
Date de naissance :	Ville :
Établissement :	
Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d'urgence :	

Noter l'HEURE du début des SIGNES


Réaction d'emblée **GRAVE** :

- Voix qui change
- Gêne respiratoire, sifflement, toux
- Douleur abdominale intense, vomissements
- Démangeaisons (mains, pieds, cuir chevelu)
- Gonflement du visage et du cou
- Malaise, sensation de mort imminente, sensation bizarre, perte de connaissance en dehors d'un contexte traumatique

Réaction **MODÉRÉE** :

- Bouche qui pique ou gratte
- Nez qui coule
- Yeux qui piquent
- Lèvres qui gonflent
- Plaques rouges qui grattent
- Un peu mal au ventre et envie de vomir

MAIS PARLE ET RESPIRE BIEN




CONDUITE À TENIR

1. Allonger l'élève ou le laisser demi-assis en cas de gêne respiratoire
2. Utiliser **le stylo auto-injectable d'Adrénaline** dans la face antéro-externe de la cuisse :

3. **Puis appeler le SAMU 15 ou 112**
4. Si gêne respiratoire faire inhaler avec la chambre d'inhalation :

5. Faire une **2^{ème} administration d'Adrénaline** en cas de persistance des symptômes après 5 minutes

1. Antihistaminique :
2. Autres :
3. Surveiller l'enfant au calme jusqu'à disparition des signes
4. **En l'absence d'amélioration, appeler le SAMU 15 ou 112**
5. Prévenir les parents



Date :

Nom et cachet du médecin référent de la pathologie :



EPIPEN



Enlever le capuchon bleu



Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 sec.



Puis massez la zone d'injection

JEXT



Enlever le bouchon jaune



Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer fermement jusqu'à entendre un déclic en tenant la cuisse et maintenez appuyé pendant 10 sec.



Puis massez la zone d'injection

ANAPEN

Code: 34-009



Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille



Retirer le bouchon noir protecteur



Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse



Puis appuyer sur le bouchon rouge de déclenchement et maintenez appuyé pendant 10 secondes. Puis masser la zone d'injection

EMERADE



Enlever le capuchon protecteur de l'aiguille



Placer et appuyer le stylo contre la face externe de la cuisse. Maintenir le stylo contre la cuisse pendant environ 5 secondes



Masser légèrement le site d'injection